

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.09.2019/11458

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ *	Bağ mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	150 gr/100 L su	21 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	150 gr/100 L su	3 gün
	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)		
Kayısı	Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmia carpophila</i>)	1.uygulama: 350 gr/100 L su	14 gün
		2.uygulama: 175 gr/100 L su	
		3.uygulama: 175 gr/100 L su	
Zeytin	Zeytinlerde halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i>)	175 gr/100 L su	14 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	175 gr/100 L su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırmaya işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Domates-Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi konid örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak uygulamaya 7-10 gün ara ile devam edilir.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR
CULVİN OPTİ

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

GRUP M1 Fungisit (Mantar ilacı)

%30 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yutulduğunda bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ağrısı, tahrişe neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formu'nu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz

Soluma: Hasta derhal uygulama alanından uzaklaştırılarak temiz havaya çıkarılır. Hastanın elbiseleri gevşetilir dinlendirilir.

Yutma: Ürün GBF'sini göstererek derhal tıbbi yardım alınır. Kusturmayınız, kusma durumunda, o anda nefes almasını önlemek için başı öne doğru eğiniz. Bilinç kaybı durumunda doktor görene kadar ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Etkilenen kişiyi yatar pozisyonda tutunuz.

Deri Teması: Cilde temas etmesi durumunda etkilenen bölgenin akan su ve nötr sabunla temizlenmesi önerilmektedir. Ciltte tahriş durumunda Güvenlik Bilgi Formu ile doktora başvurunuz.

Göz Teması: Bol suyla gözleri en az 15 dakika durulayınız. Etkilenen kişinin gözlerini ovuşturmasını veya kapamasını engelleyiniz. Kazaya uğrayan kişi kontak lens kullanıyorsa ve lensler göze yapışmış değilse çıkarılmaları gerekir. Her durumda, yıkama işleminden sonra, ürün GBF'si ile birlikte doktora başvurulması gerekir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidötu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bakır hidroksit

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



Bahadır Sağlam

Domates-Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulama devam edilir.

Bağ Mildiyösü:

- 1. uygulama:** Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
- 2. ve diğer uygulamalar:** İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Elma Karalekesi

- 1. uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
- 2. uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
- 3. uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
- 4. ve diğer uygulamalar:** Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Ege bölgesinde

- 1. uygulama:** Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
- 2. uygulama:** İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
- 3. uygulama:** Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Marmara bölgesinde

- 1. uygulama:** Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
- 2. uygulama:** Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Akdeniz bölgesinde

- 1. uygulama:** Hasattan sonra,
- 2. uygulama:** İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
- 3. uygulama:** Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir

Kayırsı-Yaprak Delen (çil):

- 1. uygulama:** Sonbaharda yaprak döneminden hemen sonra yapılır.
- 2. uygulama:** İlbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) yapılır.
- 3. uygulama:** Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyırılırken yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CULVİN OPTİ adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CULVİN OPTİ**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (M1 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU

CULVİN OPTİ organik fosforlu ürünler ile karıştırmayınız. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan tek başına kullanınız.

15 Mart 2023

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR
CULVİN OPTİ

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

GRUP	M1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	-------------------------

%30 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit



FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

ÜRETİM TESİSİ:

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15
Döşemealtı/ANTALYA



Bahadır Sağlam