

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.09.2019/11457

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|--------------|---|-----------------|--|
| Armut | Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>) | 125 ml/100 L su | 21 gün |
| Bağ * | Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
| Domates | Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>) | 150 ml/100 L su | 7 gün |
| Elma | Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>) | 125 ml/100 L su | 21 gün |
| Turunçgiller | Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata f.sp.citri</i>) | 250 ml/100 L su | 14 gün |
| Zeytin | Zeytinlerde halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea = Cycloconium oleaginum</i>) | 125 ml/100 L su | 14 gün |
| Kayısı | Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus = Stigmomyces carpophila</i>) | 125 ml/100 L su | 10 gün |
| Kiraz | Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa = Sclerotinia laxa</i>) | 125 ml/100 L su | 7 gün |
| Nar | Narda kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>) | 125 ml/100 L su | 14 gün |

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut Karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. S. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

SMARTCOP

Süspansiyon Konsantré (SC)

GRUP M:1 Fungisit (Mantar ilacı)

65.82 g/L Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRLENME BELİRTİLERİ: Yutulduğunda bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ağrısı, tahrişe neden olur.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ

Bir zehirlenme sonucunda belirlenen maruz kalmanın üzerinden zaman geçtikten sonra ortaya çıkabilir, bu nedenle tereddüt edilmediği takdirde, kimyasal ürüne doğrudan maruz kalma veya rahatsızlığın devam etmesi durumunda bu ürünün GBF'sini göstermek suretiyle tıbbi yardım talebini bulununuz.

Soluma: Bu ürün, bulunduğu tehlikeli olarak sınıflandırılmış malzemeler içermez, ancak, zehirlenme belirtileri görüldüğü halde, hasta derhal uygulama alanından uzaklaştırılarak temiz havaya çıkarılır. Hastanın elbiseleri gevşetilir dinlendirilir.
Yutma: Ürün GBF'ini göstererek derhal tıbbi yardım alınır. Hastanın bilinci yerinde ise parmağı boğazına sokarak veya ılık tuzlu su vererek hastayı kusturunuz. Bilinci yerinde değil ise kusturmaya çalışmayınız ve ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.

Deri Teması: Cilde temas etmesi durumunda ürünle bulaşık giysileri derhal çıkarınız. Ürün ile temas kısımlar bol su ve sabunla yıkayınız.

Göz Teması: Ortam sıcaklığında bol suyla gözleri en az 15 dakika durulayınız. Etkilenen kişinin gözlerini ovuşturmasını veya kapamasını engelleyiniz. Kazaya uğrayan kişi kontak lens kullanıyorsa ve lensler göze yapışmış değilse çıkarılmaları gerekir.

ULUSAL ZEHR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidot yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bakır sülfat

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P264: Kullandıktan sonra yıkayarak iyice temizleyiniz.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/Koruyucu kıyafet/Göz koruyucu/koruyucu ayakkabı kullanınız.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



Başarısız Sağlam

Bağ Mildiyözü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. uygulama: Ürünün etki süresine göre 10-11 gün ara ile uygulanmalıdır.

Domates-Mildiyö:

- ilk hastalık belirtileri görüldüncce uygulamaya başlanır ve birer hafta ara ile uygulamalar sürdürülür.

Elma Karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Turuncgiller- Kahverengi Leke:

- Sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulama meyvenin yaklaşık 4 cm olduğu döneme kadar 10-11 gün ara ile devam edilir.

Zeytinlerde Haikali Leke:

- Ege bölgesinde**
1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
 2. uygulama: İkbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
 3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Marmara bölgesinde

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Akdeniz bölgesinde

1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İkbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Kayısı-Yaprak Delen (çil):

1. uygulama: Sonbaharda (dormant dönem) yaprak döneminden hemen sonra yapılır.
2. uygulama: İkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) yapılır.
3. uygulama: Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sınırlanır yapılır.

Kiraz- Çiçek Montiyası:

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2. uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Narda Kahverengi Leke:

1. uygulama: Çiçek tomurcuqları belirginleşmeye başladığında,
2. uygulama: Taç yaprakları döktülmeye başladığında,
3. uygulama: Meyveler yarı büyüklüğüne gelince yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SMARTCOP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarıyan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SMARTCOP**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplamlı uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (M:1 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU: **SMARTCOP** yüksek alkali reaksiyonlu pestisitlerle karıştırmayınız. Diğer bitki koruma Ürünleri ile karışıma ihtiyaç duyulması halinde ön karışım testi yapılmalıdır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SA.Ş. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

SMARTCOP

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP M:1 Fungisit (Mantar ilacı)

65.82 g/L Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1
Selçuklu/KONYA
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

ÜRETİM TESİSİ:

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15
Döşemealtı/ANTALYA



Bahadır Sağlam



(Signature)

17 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR