



Bitki
Koruma

Herbisit

Yabancı
Otları İlacı

**Doğru zamanda, doğru dozda, doğru
ilaçlama ile yabancı otlara karşı
mükemmel koruma!**

ACS Metox SE

452,42 g/L 2,4-D EHE + 6,25 g/L Florasulam



ACS Metox SE



Süspo Emülsiyon (SE)

45,42 g/L 2,4-D EHE + 6,25 g/L Florasulam

SECTOR

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	KULLANMA DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Buğday Arpa	Kandamlası (<i>Adonis aestivalis</i>) İtalyan siğir dili (<i>Anchusa azurea</i>) Yatık boya kökü (<i>Aspergus procumbens</i>) Taşkesen otu (<i>Elysioides arvensis</i>) Sarıot (<i>Boreava orientalis</i>) Rum yabancı keteni (<i>Camelina rumelice</i>) Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>) Boynuz otu (<i>Cerastium dioctanum</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Kırac tırtı (<i>Geranium stepporum</i>) Sarıkkı meyveli yavru ağzı (<i>Hypocoum pendulum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Süpürge otu (<i>Sisymbrium altissimum</i>) Kaba fiğ (<i>Vicia narbonensis</i>) Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Yabani civit otu (<i>Isatis tinctoria</i>) Trakya hardal (<i>Neslia apiculata</i>)	50 ml/da	—
Buğday Arpa	Tarlı papatyası (<i>Anthemis fumanifolia</i>) Saka diken (<i>Carduus pycnocephalus</i>) Tarla hezeranı (<i>Consolida regalis</i>) Boynuzlu yoğurtotu (<i>Galium tricornutum</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardi</i>) Tarlı düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Parmaklı yavşan otu (<i>Veronica triphyllos</i>) Meryem diken (<i>Silybum marianum</i>)	60 ml/da	—
Buğday Arpa	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Gökbaş (<i>Centaurea cyanus</i>) Köyğöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Doğu balıbabası (<i>Wicdanaria orientalis</i>)	70 ml/da	—
Mısır	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Uzun loğusa otu (<i>Aristolochia clematitidis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yatık sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>) Gökbaş (<i>Centaurea cyanus</i>) Gece sefası (<i>Ipomea stolonifera</i>) Adi soda otu (<i>Salsola kali</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	70 ml/da	—
Mısır	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Tarlı sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	80 ml/da	—



*Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: ACS METOX SE uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır. Yelpeze huzmeli meme ile kullanılır.

Hububat (Buğday, Arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı devrede kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 °C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

