

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Şeker Pancarı	Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Gökbaş =Peygamber çiçeği (<i>Centaurea cyanus</i>) Papatya (<i>Matricaria spp.</i>) Eğikbaşlı kangal (<i>Carduus nutans</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Yabani salata (<i>Lactuca scariola</i>) Kanarya otu = İmam kavuğu (<i>Senecio vulgaris</i>)	100 ml/da Şekerpancari ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Kanola	Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Kuşotu = Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Kanarya otu = İmam kavuğu (<i>Senecio vulgaris</i>) Aslan dişi=Karahindiba (<i>Taraxacum officinale</i>) Yabani fiğ (<i>Vicia spp</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Deve tabanı (<i>Tussilago farfara</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Yabani krizantem (<i>Chrysanthemum segetum</i>)	100 ml/da Çıktış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır.(2-6 yaprak)
Buğday	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)	100 ml/da Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar otun 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Soğan	Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)	50 ml/ da - Soğan ve köygöçüren çıktıktan sonra, köygöçürenin 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

LACTUNA 100

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu O Herbisit (Yabancı ot ilacı)

100 g/L Clopyralid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve görmede bulanıklık yapar.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunum: Zehirlenme belirtileri görülmesi halinde etkilenen kişinin temiz havaya çıkarınız ve dinlendiriniz. Belirtiler devam ederse tıbbi yardım isteyiniz.

Cilt: Cilde temas etmesi durumunda etkilenen bölge su ve sabunla temizlenmelidir. Ciltte tahriş görülürse Güvenlik Bilgi Formu ile doktora başvurunuz. Deride kabarıklık olması durumunda hiçbir surette patlatılmamalıdır.

Göz: Gözlerle temas durumunda etkilenen kişinin gözlerini ovmasını veya kapatmasını engelleyerek bol suyla en az 15 dakika durulayınız. Kontakt lens varsa çıkarınız. Doktora başvurunuz.

Yutma: Yutulması halinde acilen tıbbi yardım alınmasını sağlayınız

ANTİDOTU VE TEDAVİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

Ek-2

İçindekiler: Clopyralid

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/yüz koruyucu/Koruyucu kıyafet/koruyucu ayakkabı kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.


EUH066: Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.



Özalp S. Özalp



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Şekerpancarı: Şekerpancarı ve köygöçüren çıktıktan sonra kullanılır. En etkili sonuç köy göçürenin 2-4 yapraklı döneminden, boyu 15-20 cm kadar olan dönemde alınır.

Buğday: Kardeşlenme döneminde, kokar otun 2-4 yapraklı döneminde kullanılır.

Kanola: Kanola ve yabancı otlar çıktıktan sonra yabancı otların erken gelişme yani 2-6 yapraklı dönemde kullanılır.

Soğan: Soğan ve köygöçüren çıktıktan sonra, köygöçürenin 2-4 yapraklı döneminde kullanılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

LACTUNA 100 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup O** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **LACTUNA 100** ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup O harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması tavsiye olunur.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

LACTUNA 100

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu O Herbisit (Yabancı ot ilacı)

100 g/L Clopyralid

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Ek-2

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal a açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİM TESİSİ

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas O.S.B 17. Nolu Yol Cad. No:3 Bor/NİĞDE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1


Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 Faks: +90 332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr



Behadır SAĞLAM



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

28 Şubat 2024

Ver: 02/07.02.2024