

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 28.11.2024/13335

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Hıyar (Sera)	Kırmızı örümcekler ( <i>Tetranychus</i> spp.)	800 ml/100 l su
Şeftali	Dut kabuklubiti ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> )	3000 ml/100 l su
Elma	San Jose kabukulu biti ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )	2500 ml/100 l su
Armut	Armut psillidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	1500 ml/100 l su

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI


Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Şeftali için ilaç normu 50l – 200l/da'dır.

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARIŞAN  
Başkan

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

09 Mart 2026

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

# SECTOR

## XANTEN 800

Emülsiyeli Olabilen Konsantre (EC)

Grubu	-	İnsektisit-Akarisit (Böcek- Kırmızı örümcek ilacı)
-------	---	---

800 g/l Mineral Yağ

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Solum:** Hastayı temiz havaya çıkarınız. Solunma güçlüğü varsa oksijen veriniz. Hemen doktora başvurunuz.

**Cilt ile temas:** Etkilenen vücut kısımlarını 10-15 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayınız. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurunuz.

**Göz ile temas:** Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Lens varsa çıkarınız. Gerekirse doktora başvurunuz.

**Yutma:** Sindirilmesi durumunda, bu ürünün GBF'sini göstererek tıbbi yardım isteyiniz.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Mineral Yağ, Hint yağı etoksillenmiş oleat

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P301+P310: YUTULMASI HALİNDE: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P331: Kusturmayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Şule ÇANAKCI  
Ruhsatlandırma Uzmanı

  
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Büyükkoyunçuk, Hıdırlı, Üç. Cd. No:9/1 Selçuklu/KONYA  
T. 444 1283 F. 035 248 00 94 www.sectortarim.com.tr  
SELÇUK VE BİLİM 23 TİC. SİC. NO: 26437

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Hıyar (Sera)- Kırmızı örümcekler:** İlk sayım için çiçeklenme döneminde seraya parsellerin köşegenlerinden çapraz girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı 10 adettir. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızı örümcekler büyüteç ile sayılıp kaydedilir. Toplam canlı kırmızı örümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızı örümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

**Şeftali- Dut Kabuklu biti:** Yaz mücadelesi olarak uygulamalar yapılır. İlk larva çıkışında birinci ve bu uygulamadan 20 gün sonra ikinci uygulama yapılır.

**Elma- San Jose kabuklu biti:**

**Kış mücadelesi:** Meyve ağaçlarının kış uykusunda buldukları dönemde, gözlerin uyanmasından iki hafta önceye kadar sıcaklığın 5°C'nin üzerinde olduğu ve yağışsız günlerde Ocak-Mart aylarında uygulanır.

**Erken ilkbahar mücadelesi:** Ağaçlar gözler uyandıktan sonra, pembe tomurcuk dönemine kadar, zararlıların larva döneminde uygulanır.

**Yaz mücadelesi:** San-Jose kabuklubiti'nde yavrulama başladığı günlerde birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır. İkinci döle karşı da aynı şekilde ilaçlama yapılmalıdır.

**Armut- Armut Psillidi:** Kışlayan döl erginlerinin yumurtalarına karşı mart ayından itibaren yapılan kontrollerde 100 sürgünde en az 10 yumurta görüldüğü zaman ilaçlama yapılır. Bölgelere göre değişmekle birlikte mart- nisan aylarında yapılan sürgün kontrollerinde kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

**XANTEN 800 hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.**

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: XANTEN 800** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup -** olarak sınıflandırılmış bir insektisit - akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek **XANTEN 800**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup - harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

**SECTOR**

**XANTEN 800**

Emülsiyeli Olabilen Konsantre (EC)

Grubu	-	Insektisit-Akarisit (Böcek- Kırmızı Örümcek İlacı)
-------	---	---

800 g/l Mineral Yağ



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

09 Mart 2026

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki gelişmesinde değişikliklere neden olabileceğinden uygulama sırasında komşu ekilişlerine sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- Yazlık yağ tatbikatından 2 ay önce ve 2 ay sonrasına kadar olan süre içinde **Folpet** ve **Captan** etkili maddeli BKÜ'ler kullanılmamalıdır.
- Kükürtlü BKÜ'ler ile birlikte veya kükürtlü BKÜ'lerin tatbikatından 3 hafta sonrasına kadar uygulama yapılamaz.
- Çok düşük sıcaklıkta (4°C'nin altında) ve yüksek sıcaklıkta (32°C'nin üzerinde) uygulama yapılmamalıdır ve depolanmamalıdır.
- Ağaçlar solgun durumda iken, önce sulama yapılmalı daha sonra uygulama yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

MERKEZ OFİS: Büyükkayacak OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1

Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 | Fax: +90 332 345 00 93 | [www.sectortarim.com.tr](http://www.sectortarim.com.tr)

FABRİKA: Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36

Merkez/AKSARAY



