

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.09.2019/11454

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Bağ Mildiyözü ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200 ml/100 L su	21 gün
Domates**	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	200 ml/100 L su	14 gün
	Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	175 ml/100 L su	
Zeytin	Zeytinlerde halkalı leke ( <i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i> )	150 ml/100 L su	21 gün
Şeftali, Nektarin	Şeftali yaprak kıvrıcıklığı ( <i>Taphrina deformans</i> )	300 ml/100 L su	21 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

\*\*Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı bitki koruma ürünlerinin tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungusitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ürünlerle en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Bağlardaki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu için genel bir referans olarak 10 – 150 l/da alınabilir.

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkayın. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR  
07 Mart 2020

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

# SECTOR

## ZETACUPE

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

700 g/L Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evede kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak içice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Ağızda madeni bir tat, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma, hızlı soluma, baş dönmesi, heyecan, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, fazla miktarda alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Göz:** Derhal gözleri ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lenslerinizi hemen çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın.

**Deri:** Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

**Yutma:** Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini gösterin. Hastayı kusmaya zorlamayın.

**Solama:** Hastayı açık havaya çıkarın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Belirtilere göre tedavi uygulayın. Hastayı yalnız bırakmayın. Metahemoglobinemi söz konusu ise %1'lik Metilen Mavisi verin. Gerekli durumlarda sindirim sistemi endoskopisi, hidroelektrik kontrol, kan basıncı kontrolü, karaciğer ve böbrek fonksiyon kontrolleri yapılmalıdır.

**Antidotu:** EDTA, British Anti-Lewisite (BAL) DIMECAPROL-A veya PENICILAMINA.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı:  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bakır oksiklorür, Etan-1,2-diol

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre imha edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl ve havuz sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.

Şule ÇANAKCI  
Ruhsatlandırma Uzmanı



## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

### Bağ - Bağ Mildiyözü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çığ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

### Domates - Mildiyö:

Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyişi alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak uygulamaya 7-10 gün ara ile devam edilir.

### Domates - Erken Yaprak Yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulama devam edilir.

### Zeytin - Zeytinlerde halkalı leke:

#### Marmara bölgesinde

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

#### Ege bölgesinde

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

\*Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

#### Akdeniz bölgesinde

1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

### Şeftali, Nektarin - Yaprak Kıvrıklığı:

- 1.uygulama: Sonbaharda yapraklar % 80 döküldükten sonra,
- 2.uygulama: İlbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

ZETACUPE hakkında bir şikâyetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** ZETACUPE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ZETACUPE'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

# SECTOR

## ZETACUPE

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

700 g/L Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid



### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

MERKEZ OFİS: Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 | Fax: +90 332 345 00 93 | [www.sectortarim.com.tr](http://www.sectortarim.com.tr)

FABRİKA: Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI  
Ruhsatlandırma Uzmanı



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

07 Nisan 2026