

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 09.01.2025/13387

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Hıyar (Sera)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Kornişon (Sera)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Çilek	Çilek küllemesi (<i>Sphaerotheca macularis</i> f.sp. <i>fragariae</i>)	100 ml/da	3 gün
Çilek	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/da	3 gün
Marul (Tarla)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	100 ml/da	3 gün
Soğan Sarımsak	Soğan Pası (<i>Puccinia porri</i>)	100 ml/da	7 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 ml/100 L su	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

09 Ocak 2025

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

PUGNATOR SC 500

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup C2:7 D1:9 Fungisit (Mantar ilacı)

375 g/L Pyrimethanil + 125 g/L Fluopyram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Göz: Gözlerle temas durumunda etkilenen kişinin gözlerini ovmasını veya kapatmasını engelleyerek bol suyla en az 15 dakika durulayınız. Kontakt lens varsa çıkarınız. Doktora başvurunuz.

Cilt: Cildi su ve sabunla temizleyiniz. Ciltte tahriş görülür ise Güvenlik Bilgi Formu ile doktora başvurunuz.

Soluma: Kişiyi alandan uzaklaştırarak temiz havaya çıkarınız. Belirtiler kötüleşir veya devam ederse tıbbi yardım isteyiniz.

Yutma: Kusturmayınız, kusma durumunda başı öne doğru eğiniz. Etkilenen kişiyi yatar pozisyonda tutunuz. Ağzı su ile çalkalayınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Pyrimethanil, Fluopyram

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven /Koruyucu kıyafet /solumum koruma/ Göz koruyucu/ koruyucu ayakkabı kullanınız.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

Bahadır SAĞLAM
Ruhsatlandırma Müdürü



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Domates (Sera), Biber (Sera), Patlıcan (Sera) - Kurşuni küf: Hastalıkla kimyasal mücadele, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Hıyar, Kornişon (Sera) – Sebzelerde beyaz çürüklük:

Mücadele toprak uygulaması veya yeşil aksam uygulaması halinde yapılır.

Toprak uygulaması: İlaçların etiketlerinde belirtildiği şekilde ekim veya dikimden önce uygulanır.

Yeşil aksam uygulaması: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

Çilek - Çilek küllemesi:

1. **uygulama:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde,

2. **ve diğer uygulamalar:** Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara devam edilir.

Çilek - Kurşuni küf:

1. **uygulama:** İlk çiçeklerin %10'u açınca,

2. **uygulama:** Çiçeklerin %50'si açınca,

3. **uygulama:** İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Marul (Tarla) - Sebzelerde beyaz çürüklük: Mücadele toprak uygulaması veya yeşil aksam uygulaması halinde yapılır.

Toprak uygulaması: İlaçların etiketlerinde belirtildiği şekilde ekim veya dikimden önce uygulanır.

Yeşil aksam uygulaması: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

Soğan, Sarımsak – Soğan pası: Uygulama yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir.

Elma – Elma karalekesi:

1. **uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),

2. **uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplaryla ayrı ayrı görüldüğünde),

3. **uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. **ve diğer uygulamalar:** Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: PUGNATOR 500 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 ve D1:9 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PUGNATOR 500 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 ve D1:9 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

09 Ocak 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR**PUGNATOR SC 500**

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup C2:7 D1:9 Fungisit (Mantar ilacı)

375 g/L Pyrimethanil + 125 g/L Fluopyram

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİM TESİSİ

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB 17. Nolu Yol Cad. No:3 Bor/NİĞDE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkaymak OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1

Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 Faks: +90-332 345 00 93

Bahadır SAĞLAM
Ruhsatlandırma Müdürü



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı