

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 30.11.2023/12923

### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kök-ur nematodları (Meloïdogyne spp.)	60 ml/da	7 gün
Hıyar (Sera)	Kök-ur nematodları (Meloïdogyne spp.)	60 ml/da	7 gün
Kornişon (Sera)	Kök-ur nematodları (Meloïdogyne spp.)	60 ml/da	7 gün
Patates	Kök-ur nematodları (Meloïdogyne spp.)	120 ml/da	-
Biber (Sera)	Kök-ur nematodları (Meloïdogyne spp.)	60 ml/da	14 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

**Domates (sera), biber (sera), hıyar (sera), kornişon (sera) ve patlıcan (sera) için:** Önce damlama sulama sistemi çalıştırılarak toprak tarla kapasitesine gelene kadar su verilir. Daha sonra birim alana uygulanacak ürün miktarı ayrı bir kaptan hazırlanıp damlama sulama sistemiyle uygulama alanına verilir ve arkasından 15-20 dakika tekrar temiz su verilerek ürünün toprağa nüfuz etmesi sağlanır. Sulama ve uygulamalar sırasında suyun homojen olarak dağılmasına ve bitkinin etkili kök bölgesine inmesine dikkat edilmelidir. **Patates için:** SECPRIME SC 400 patates bitkisinin ekiminden önce, keseksiz iyi hazırlanmış toprağın yüzeyine satih uygulaması şeklinde yapılmalıdır. Uygulamadan sonra toprak diskaro aleti ile karıştırıldıktan hemen sonra patatesler ekilmelidir.

### KALİBRASYON

**Damlama sisteminin kalibrasyonu,** bastan ve sondan 3'er meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10'u geçmemelidir. Birim alana verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir. **Uygulama makinesinin kalibrasyonu,** uygulama öncesinde yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

**SECTOR**

**SECPRİME SC 400**

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	C2,7	Nematisit (Nematod ilacı)
------	------	---------------------------

400 g/L Fluopyram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 4 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Bilinen bir semptomu yoktur.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Göz:** Gözlerle temas durumunda etkilenen kişinin gözlerini ovmasını veya kapatmasını engelleyerek bol suyla en az 15 dakika durulayınız. Kontakt lens varsa çıkarınız. Doktora başvurunuz.

**Cilt:** Cildi su ve sabunla temizleyiniz. Ciltte tahriş görülür ise Güvenlik Bilgi Formu ile doktora başvurunuz.

**Soluma:** Kişiyi alandan uzaklaştırarak temiz havaya çıkarınız. Belirtiler kötüleşir veya devam ederse tıbbi yardım isteyiniz.

**Yutma:** Kusturmayınız, kusma durumunda başı öne doğru eğiniz. Etkilenen kişiyi yatar pozisyonda tutunuz. Ağız su ile çalkalayınız.

**ANTİDOTU VE TEDAVİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM), TEL:114

08 Mayıs 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)

MÜDÜRÜLÜĞÜ



Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Fluopyram

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçınınız.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/ Koruyucu kıyafet/ solunum koruma/ göz koruyucu/ koruyucu ayakkabı kullanınız.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P501: İçeriği/ kabı yerel/ bölgesel/ ulusal/ uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.



Bahadır HECM

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**

Domates (sera), Biber (sera), Hıyar (sera) ve Kornişon (Sera) - Kök-ur nematodları: İki uygulama yapılması gerekmektedir.

**1. uygulama:** (60 ml/da dozda) fide şaşırtıldıktan 1 gün sonra,

**2. uygulama:** (60 ml/da dozda) ise ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Önerilen uygulama sayısını (2 uygulama) aşmayınız.

**Patates - Kök-ur nematodları:** Ekim öncesi 120 ml/da doz bir defada uygulanır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** SECPRİME SC 400 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C2,7** olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SECPRİME SC 400**'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C2,7 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARISIBILİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

**SECTOR**

**SECPRİME SC 400**

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	C2,7	Nematisit (Nematod ilacı)
------	------	---------------------------

400 g/L Fluopyram

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİM TESİSİ**

ROYALFEN KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Osb 17. Nolu yol No:3 Bor/Niğde

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr



J.Ö.K

09 Mayıs 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

