

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 02.02.2015-10070

ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER

BİTKİ ADI	UYGULAMA AMACI VE DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU (100 L Suya)
SOFRALIK ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce somaklar henüz 4-8 cm boyda iken salkımların boyunu uzatmak amacı için kullanılır. 2. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde, yani çiçek taç yapraklarının %70- 80'inin döküldüğü devrede tane seyreltmek için kullanılır. 3. uygulama: Çiçeklenmeden sonra taneler 3 mm saçma iriliğine ulaştığında tane irileştirmek için kullanılır.	100 ml
KURUTMALIK ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi arttırmak ve hasadı öne almak için kullanılır.	50 ml
MANDALİN	Satsuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu arttırmak ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin %75-80'inin açtığı devrede kullanılır.	75 ml
PORTAKAL	Yafa portakallarında haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel'de meyvelerin ağaçta kalma süresini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.	100 ml
LİMON	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.	50 ml
GREYFURT	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacı ile meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.	50 ml
ARMUT	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerin %30'u açtığı devrede verimi arttırmak için kullanılır. Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için kullanılır.	75-100 ml 25-100 ml
KIRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ	Hasadı geciktirmek, iri ve parlak daneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı dönemde kullanılır. Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3- 7 gün gün geciktirir ve şeftalinin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini önler.	75 ml 75 ml
ÇİLEK	Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğalmasını temin için, anaç bitki 1-6 yapraklı iken mahsule yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveleri irileştirmek ve verimi arttırmak için ise çiçeklenmeden 3- 4 hafta önce kullanılır.	75-125 ml
ENGİNAR	Hasadı 1-2 ay öne almak düzgün şekilli ve iri baş elde etmek amacı ile bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına kullanılır.	125-150 ml
PATATES	Tohumluk patatesler dikilmeden önce hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.	25- 50 ml
MARUL	Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7- 15 gün önce kullanılır.	50 – 100 ml

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS MAXGIBB 20 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	-	Bitki Gelişim Düzenleyici (BGD)
-------	---	---------------------------------

20 g/L Gibberellic acid (GA₃)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Tedbirler: Maddenin bulunduğu bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Gerekirse doktora başvurun.


Cilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Solunum: Hastayı temiz havaya çıkartın, hareketsiz ve ılık tutun. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net miktar:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Gibberellic acid

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik Riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Önerilen dozlar dikkate alınarak hazırlanan solüsyon bitki yapışmasını sağlamak için bir yayıcı- yapıştırıcı ile karıştırılarak püskürtülmesi tavsiye edilir.
- Serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
- Doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında fitotoksik değildir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarla uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

Süleyman TERLEMEZ

SECTOR

Ziraat Mühendisi

Diploma No: 1841 – 1998

U. Sahar

BİBER	Verimi arttırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra kullanılır.	150 ml
SÜS BİTKİLERİ	Türlere ve bitkilerin tiplerine göre değişmekle birlikte çiçekçilikte (Karanfil, Gül, Glayöl, Lisianthus, Krizantem) uzun sap ve iri çiçek elde etmek için kullanılır.	200-750 ml

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez, gerekiyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

21 Eylül 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE TARIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHÜR İZLENİMLERİ
39

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS MAXGIBB 20 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	-	Bitki Gelişim Düzenleyici (BGD)
-------	---	---------------------------------

20 g/L Gibberellic acid (GA₃)

ÜRETİM TESİSİ

TARKİM BİTKİ KORUMA SAN VE TİC A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi, Turgutlu Caddesi, No:287
Şehzadeler/MANİSA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1
Selçuklu/KONYA
Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

Süleyman TERLEMİZ

Ziraat Mühendisi

Diploma No: 1841 - 1998

U. Behadur STAN

