

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih Ve Numarası: 18.06.2014/9698

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Bağ *	Köpekdişi ayrığı Kanyaş	(<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) 100 ml/da Köpekdişi ayrığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşle iken
Domates	Köpekdişi ayrığı Darıcan Kanyaş	(<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) 100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış Sonrası
Ayçiçeği	Tilkikuyruğu Brom Köpekdişi ayrığı Darıcan Yabancı arpa Yabancı darı Çayır püskülü Yapışkan darı Kanyaş	(<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Bromus sp.</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Hordeum spontaneum</i>) (<i>Panicum spp.</i>) (<i>Poa spp.</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) 100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış Sonrası
Soğan	Darıcan Yapışkan darı Kanyaş	(<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) 100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda, kanyaş 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda iken
Kırmızı Mercimek	Tilkikuyruğu Kısrı yabancı yulaf Kendi gelen arpa Kendi gelen buğday	(<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Hordeum vulgare</i>) (<i>Triticum aestivum</i>) 75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış Sonrası
	Ayrık	(<i>Elymus repens</i>) 100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış Sonrası
Şeker Pancarı	Tilkikuyruğu Yabancı yulaf Püsküllü çayır Darıcan	(<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena fatua</i>) (<i>Bromus tectorum</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) 75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Pamuk	Kanyaş	(<i>Sorghum halepense</i>) 75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya Fasulyesi	Tilkikuyruğu Köpekdişi ayrığı Darıcan Kuşyemi Yabancı darı Kanyaş	(<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Phalaris spp.</i>) (<i>Panicum spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) 100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış Sonrası

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS Q-SUPER 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup A,1 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Genel Tedbirler: Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Gerekirse doktora başvurun.

Cilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etiklenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkartın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

04 Mart 2022

Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net miktar:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Quizalofop-p-ethyl, Xylol

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun sigara içilmez.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anırla zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- İlacı serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- İlacı kendi ambalajında, ağız kapalı muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını, atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya uygun bir yöntemle imha ediniz.
- Tohumlarla temas ettirmeyiniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörülü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

MS.

Kanola	Delice	(<i>Lolium temulentum</i>)	200 ml/da Çıkış Sonrası
	Tilkikuyruğu Kısır yabancı yulaf Köpekdişi ayrığı Kuşyemi Çayır püskülü Yapışkan darı Kendi gelen buğday	(<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Phalaris spp.</i>) (<i>Poa sp.</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml/da Çıkış Sonrası
Nohut	Tilkikuyruğu Yabancı yulaf Kendi gelen buğday	(<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena fatua</i>) (<i>Triticum aestivum</i>)	75 ml/da Çıkış Sonrası

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

ACS Q-SUPER 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACS Q-SUPER 5 EC aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS Q-SUPER 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	A,1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
------	-----	-----------------------------

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

FİRMA BEYANI


Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

TARKIM BITKİ KORUMA SAN VE TİC A.Ş.
Turgut Ozal Mahallesi, Turgutlu Caddesi, No:287
Şehzadeler/MANİSA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.
Büyükkayak OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1
Selçuklu/KONYA
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectorfarm.com.tr



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

04 Mart 2022

AK