

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
SELECTRA PLUS 18-18-18+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 18
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%3
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	%11
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 18
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,03

UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama
Sera Sebzelelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı -5 ile + 45 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

*Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. *Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz *Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Lisans No: 740

Tescil No:

Parti/Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren Üç Yıldır.

NET AĞIRLIK: 0,25 kg -0,4 kg -0,5 kg -1 kg -2 kg -2,5 kg -3 kg -4 kg -5 kg -10 kg -15 kg -20 kg -25 kg -30 kg -35 kg -40 kg -45 kg -50 kg

ÜRETİCİ FİRMA SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA

Telefon: 444 1 283 Faks: 0 332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr info@sectortarim.com.tr



TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

