

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCILAR OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OT	Kullanım Dozu	Kullanım Dönemi
AYÇİÇEĞİ (IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri)	Horozibiği ( <i>Amaranthus albus</i> )	125 ml/da	Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı, yabancı otların 8-10 yapraklı döneminde, çıkış sonrası uygulanır
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )		
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )		
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		
	Canavarotu ( <i>Orobancha cernua</i> )		
	Çobandeğneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )		
	Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )		
Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )			
Bezelye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	100 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır
	Çobançantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )		
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )		
	Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> )		
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		
	Hakiki şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> )		
	Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> )		
	Çobandeğneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )		
	Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> )		
	Kuşotu ( <i>Stellaria media</i> )		
Isırğan otu ( <i>Urtica urens</i> )			
Yavşan otu ( <i>Veronica spp.</i> )			
Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )			
Fasulye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	100 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır
	Çobandeğneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )		
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )		
	Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> )		
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		
	Hakiki şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> )		
	Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> )		
	Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )		
Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )			
Soya	Sütleğen ( <i>Euphorbia heterophylla, E. nufans</i> )	125 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )		
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		
	Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )		
	Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> )		
Yerfıstığı	Hakiki şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> )	100 ml/da	Erken çıkış sonrası uygulanır
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		
	Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> )	125 ml/da	

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

# SECTOR

## SECTORİMA 40 SL

Suda çözünen Konsantre (SL)

Grubu B Herbisit (Yabancı ot ilacı)

40 g/L Imazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Soluma:** Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.  
**Yutma:** Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.  
**Cilt Teması:** Cildi bol su ile yıkayın.  
**Göz Teması:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

28 Eylül 2022

Net Miktarı:  
Azami Perekende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Imazamox

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P264: Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü, sabun ve su ile iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.


**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Uygulamalar yağışsız ve sakın günlerde yapılmalıdır.
- Ayçiçeği bitkilerinin uygun büyüme koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem veya kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıçratmayınız ve sulama sularına bulaştırmayınız.
- İklim ve toprak koşullarının uygun gitmediği dönemlerde herbisit uygulamaları sarma vb. görüntüler oluşturabilmektedir. Bu tür belirtiler normal olup, kısa sürede ortadan kalkar.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.

**Süleyman TERLEMEZ**

Ziraat Mühendisi

Diploma No: 1841



  
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Büyükdere Caddesi No: 92/2 Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL  
T: 444 2 22 22 F: +90 332 345 00 93 www.sectortarim.com.tr  
SECTOR ÜD. 7570217221 TİC. SİC. NO: 24437

	Çobandeğneği Çukurova fener otu	( <i>Polygonum aviculare</i> ) ( <i>Physalis angulata</i> )		
Yonca	Küsküt	( <i>Cuscuta spp</i> )	125 ml/da	Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde uygulanır

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

#### KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki Koruma Ürünü, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

#### İmidazolinone Toleranslı Ayçiçeği Çeşitlerinde Uygulama Zamanı Ve Şekli:

Temel problem Canavar otu ise, ayçiçeğinin 6-8 gerçek yapraklı döneminde; temel problem pıtrak ve etikette belirtilen diğer yabancı otlar için ise 4-6 gerçek yapraklı döneminde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve ilaçlama alanında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinde 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-40 litre su kullanılmalıdır. İlaç, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10 °C üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**SECTORİMA 40 SL**, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **SECTORİMA 40 SL**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.


**SECTOR**

**SECTORİMA 40 SL**

Suda çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	-----------------------------

40 g/L Imazamox



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

#### ÜRETİM TESİSİ

TARKİM BİTKİ KORUMA SAN VE TİC A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi, Turgutlu Caddesi, No:287  
Şehzadeler/MANİSA

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacak OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1

Selçuklu/KONYA

Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr

Süleyman TERLEMEZ

Ziraat Mühendisi

Diploma No: 1841 - 1998

u. Sahadettin SÖLÜK

