

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No: 25.01.2016-10520

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre
BUĞDAY ARPA	Kandamlası (<i>Adonis aestivalis</i>)	50 ml/da	—
	İtalyan sığır dili (<i>Anchusa azurea</i>)		
	Yatik boya kökü (<i>Asperugo procumbens</i>)		
	Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>)		
	Sarıot (<i>Boreava orientalis</i>)		
	Rum yalancı keteni (<i>Camelina rumelice</i>)		
	Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>)		
	Boynuz otu (<i>Cerastium dicotomum</i>)		
	Uzun süpürge otu (<i>Descurania sophia</i>)		
	Kıraç ıtırı (<i>Geranium stepporum</i>)		
	Sarkık meyveli yavru ağızı (<i>Hypecoum pendulum</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
Süpürge otu (<i>Sisymbrium altissimum</i>)			
Kaba fiğ (<i>Vicia narbonensis</i>)			
Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>)			
Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>)			
Trakya hardalı (<i>Neslia apiculata</i>)			
BUĞDAY ARPA	Tarla papatyası (<i>Anthemis fumariifolia</i>)	60 ml/da	—
	Saka dikenini (<i>Carduus pycnocephalus</i>)		
	Tarla hezeranı (<i>Consolida regalis</i>)		
	Boynuzlu yoğurtotu (<i>Galium tricorntum</i>)		
	Çoban değneği (<i>Polygonum bellardii</i>)		
	Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)		
Parmaklı yavşan otu (<i>Veronica triphyllos</i>)			
Meryem dikenini (<i>Silybum marianum</i>)			
BUĞDAY ARPA	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>)	70 ml/da	—
	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)		
	Gökbaş (<i>Centaurea cyanus</i>)		
	Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)		
	Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)		
*MISIR	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>)	70 ml/da	—
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Uzun loğusa otu (<i>Aristolochia clematitis</i>)		
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Yatik sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>)		
	Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>)		
	Gökbaş (<i>Centaurea cyanus</i>)		
	Gece sefası (<i>Ipomea stolonifera</i>)		
	Adi soda otu (<i>Salsola kali</i>)		
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)		
Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)			
*MISIR	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>)	80 ml/da	—
	Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)		

*Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısır yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS METOX SE

Süspo Emülsiyon (SE)

GRUP O,4 B,2 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

452,42 g/L 2,4-D EHE + 6,25 g/L Florasulam

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bulantı, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, deri ve gözde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tedbirler: Zehirlenme anında aşağıdaki belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayınız.

Yutma: Kusturmayın kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Göz Teması: Hemen su ile 5 dakika boyunca yıkayınız

Deri Teması: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlene giysilerinizi yıkayınız.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkarın doktora danışın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: 2,4-D 2-Ethylhexyl ester, Florasulam

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.
- P501: İçeriği /kabi tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLCEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Sistemik ve kontak etkili ve geniş spektrumlu bir herbisitir.
- İlaçlamadan 2 saat sonra yağın yağmur ilacın etkisini azaltmaz.
- Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için ilaçlamadan önce veya 2 saat sonra yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilir.
- Toprakta bakiye bırakmaz. Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur.
- Uygulama sonrası sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkisini geciktirebilir.
- Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
- Her türlü yer aleti ile uygulanır. Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze huzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYONU

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

ACS METOX SE uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır. Yelpeze huzmeli meme ile kullanılır.

Hububat (Buğday, Arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı devrede kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 °C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ACS METOX SE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup O,4 + B,2** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACS METOX SE**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup O,4 + B,2** harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışım önerilmez, gerekiyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS METOX SE

Süspo Emülsiyon (SE)

GRUP	O,4	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	-----	-----	-----------------------------

452,42 g/L 2,4-D EHE + 6,25 g/L Florasulam

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

TARKİM BİTKİ KORUMA SAN VE TİC A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi, Turgutlu Caddesi, No:287
Şehzadeler/MANİSA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1
Selçuklu/KONYA
Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr



12 Kasım 2021

TARIM VE ÖRMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

39

