

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Majestik Plus 14-30-14+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Azot (N)	14
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	3
Üre Azotu (N-NH ₂)	5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	14
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,001
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,03

UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.)	200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Vb.)	200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.
Tahıllarda (Yulaf, Çeltik Vb.)	200-400 g/da kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama.	-----
Yeşil Alan (Çay, Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	200-400 g/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama.	-----
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama.	1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama.

UYARILAR:

- *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- *Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlar da çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı +5 /+ 35 °C derece arasında olmalıdır.**

Tescil No: Lisans No: 740 Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır Parti No:
Net Ağırlık: 0,25-0,40-0,50-1-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 kg

ÜRETİCİ FİRMA: SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. A.Ş.

Adres: Büyükkayacak OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 **Fax:** 0 332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr info@sectortarim.com.tr



TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.